



D^r JAIMES S. BENHAMRON, C.S.P.Q., FR.C.P.(C)
GASTROENTÉROLOGIE
5513, CHEMIN QUEEN MARY
MONTRÉAL (QUÉBEC) H3X 1V4
TÉL. : 514 769-7198 • TÉLÉC. : 514 769-1306

Gastroskopie

Vous avez rendez-vous avec le Dr Benhamron pour une gastroskopie le _____

Si vous êtes dans l'impossibilité de vous présenter à cette date, veuillez nous le faire savoir **au moins 72 heures ouvrables à l'avance** au numéro suivant : **514 769-7198**.

Vous pouvez également appeler ce numéro si vous avez besoin de renseignements supplémentaires.

La gastroskopie est un examen réalisé à l'aide d'un instrument long et flexible appelé gastroscope qui permet d'explorer directement l'intérieur de l'œsophage, l'estomac et une partie du duodénum. Cet examen dure habituellement de 10 à 15 minutes.

Des prélèvements sont très souvent réalisés de façon systématique. Des polypes peuvent également être retirés, si présents.

Une injection sédatrice est administrée avant l'examen afin de vous détendre. Une anesthésie locale, sous forme d'une vaporisation au fond de la gorge est toujours administrée quelques secondes avant l'examen afin d'annihiler le réflexe normal de vomissement lors de l'introduction de l'appareil.

Vous devriez pouvoir réintégrer une diète normale environ 40 min après l'examen.

La gastroskopie est un examen très sécuritaire. Les complications sont extrêmement rares:

- La perforation de l'œsophage ou de l'estomac est extrêmement rare et peut avoir pour conséquence une fuite des fluides digestifs. Cette complication est traitée par aspiration des fluides, jusqu'à la fermeture de la fuite. Des antibiotiques ou parfois une opération peuvent être requis.

- Le saignement survient toujours après une biopsie ou une polypectomie. Mais il est mineur et dans la très grande majorité des cas s'arrête spontanément. Une cautérisation est rarement nécessaire. Il est extrêmement rare qu'une transfusion soit requise.
- Des réactions adverses ou allergiques aux médicaments sédatifs peuvent survenir rarement.
- Une irritation locale au site d'injection de la sédation peut également survenir. Celle-ci finit par s'en aller après quelques jours ou plus rarement quelques semaines.

Certains médicaments doivent être arrêtés avant la gastroskopie, sauf en cas d'avis contraire de votre médecin:

- Médicaments contenant de l'aspirine (aspirine, asaphen, rivasa, entrophén) : **arrêter 7 jours avant**
- Plavix (clodiprogel) : **arrêter 7 jours avant**
- Ticlid (ticlopidine) : **arrêter 7 jours avant**
- Coumadin ou Synthron : **arrêter 5 jours avant**
- Pradax, Pradaxa (Dabigatran) : **arrêter 4 jours avant**
- Efiend (Prasugrel) : **arrêter 8 jours avant**
- Brilinta (Ticagrelor) : **arrêter 3 jours avant**

Vous devez toujours et absolument consulter et avoir l'autorisation de votre cardiologue avant d'arrêter Plavix, Efiend ou Brilinta.

Il n'y a pas de préparation spécifique pour cet examen sinon d'être à jeun 9 heures avant, si la procédure a lieu en après-midi. On peut continuer à boire des liquides clairs jusqu'à 4 heures avant l'examen.

Veillez à ne pas conduire pendant 6 heures après l'examen.

Bon examen