

D<sup>r</sup> JAIMES S. BENHAMRON, C.S.P.Q., FR.C.P.(C)  
GASTROENTÉROLOGIE  
5513, CHEMIN QUEEN MARY  
MONTRÉAL (QUÉBEC) H3X 1V4  
TÉL.: 514 769-7198 • TÉLÉC.: 514 769-1306

## **Diète à suivre pour une coloscopie longue**

**48 heures avant la coloscopie, vous devez suivre une diète restreinte en fibres.**

**Éviter** le pain, les pâtes, les fruits, les légumes, les salades, les panures et noix de toutes sortes.

**Vous pouvez consommer** des œufs, du poisson, de la viande, de la volaille, des fruits de mer, des produits laitiers, des jus sans pulpe, des boissons gazeuses, du thé, du café et des bouillons.

---

## **Diet prior to a total colonoscopy**

**48 hours before your colonoscopy, you should follow a low-fiber diet.**

**Avoid** bread, pasta, fruits, vegetables, salads, fried foods and all type of nuts.

**You can have** eggs, fish, meat, sea-food, poultry, dairy products, free of pulp juices, tea, coffee, broth and sodas.

# PURG-ODAN®



**DR JAIMES S. BENHAMRON, C.S.P.Q FR.C.P.(C)**  
GASTROENTÉROLOGIE  
5513, CHEMIN QUEEN MARY  
MONTRÉAL (QUÉBEC) H3X IV4  
TÉL: 514 769-7198 • TÉLÉC.: 514 769-1306

Votre endoscopie est prévue le

Date: \_\_\_\_\_

Heure: \_\_\_\_\_

Lieu: \_\_\_\_\_

## DIRECTIVES POUR L'UTILISATION DE PURG-ODAN®

**Vous ne devez pas prendre PURG-ODAN® si vous souffrez d'insuffisance rénale ou d'insuffisance cardiaque.**

**Veillez suivre les directives ci-dessous (et non celles contenues dans le paquet):**

Un laxatif particulier et puissant doit être pris le jour de l'examen, et votre médecin vous a recommandé de prendre **PURG-ODAN®** que vous pouvez acheter à la pharmacie de votre quartier.

Vous devez être près des toilettes après avoir pris le médicament car il peut commencer à agir en l'espace d'une à trois heures.


**AUCUN ALIMENT SOLIDE N'EST AUTORISÉ.**

## COMMENT DEVEZ-VOUS PRENDRE PURG-ODAN® ?

Vous devez prendre **PURG-ODAN®** le jour de votre examen.

Pendant que vous prenez **PURG-ODAN®**, vous ne devez boire que des liquides clairs tels que des jus de fruits sans pulpe (jus de raisin blanc, jus de pommes, jus de canneberges clair, etc.), de l'eau, des boissons énergisantes (Gatorade), du soda au gingembre, du thé ou du café (sucré si vous le desirez), du bouillon de poulet ou de boeuf (pas plus d'un seul bouillon dans la journée). Ne buvez pas de produits à base de lait ni de liquides foncés surtout de couleur rouge ou mauve.

**Il est important de boire 8 grands verres de liquide clair (250 mL / 8 onces) pendant les 4 heures qui suivent la prise de chaque sachet.**



**Ne buvez pas seulement de l'eau.**

Le jour de l'examen, commencez votre préparation au **PURG-ODAN®** à 7h00.

**NE BUVEZ PAS  
SEULEMENT DE  
L'EAU**



**NE BUVEZ PAS  
SEULEMENT DE  
L'EAU**

### PREMIER SACHET DE PURG-ODAN® : LE JOUR DE L'EXAMEN À 7h00.

Prenez deux comprimés de Dulcolax 5 mg.

Videz le contenu du premier sachet de **PURG-ODAN®** dans une tasse.

Ajoutez 150 mL (5 onces) d'eau froide.

Remuez constamment pendant 2 ou 3 minutes jusqu'à ce que le laxatif soit dissout.

Si le mélange s'est réchauffé, laissez-le refroidir avant de le boire.

Buvez 8 grands verres de liquide (250 mL / 8 onces), incluant de l'eau, pendant les 4 heures qui suivent la prise du sachet.




### DEUXIÈME SACHET DE PURG-ODAN® : LE JOUR DE L'EXAMEN À 11h00.

Prenez le deuxième sachet de **PURG-ODAN®**.

Répétez les instructions du premier sachet.

Vous devez arrêter de boire complètement à **15h00**.



**D<sup>r</sup> JAIMES S. BENHAMRON**, C.S.P.Q., FR.C.P.(C)  
GASTROENTÉROLOGIE  
5513, CHEMIN QUEEN MARY  
MONTRÉAL (QUÉBEC) H3X 1V4  
TÉL. : 514 769-7198 • TÉLÉC. : 514 769-1306

# Coloscopie

Vous avez rendez-vous avec le Dr Benhamron pour une coloscopie longue le \_\_\_\_\_

Si vous êtes dans l'impossibilité de vous présenter à cette date, veuillez nous le faire savoir **au moins 72 heures ouvrables à l'avance** au numéro suivant: **514 769-7198**. Vous pouvez également appeler ce numéro si vous avez besoin de renseignements supplémentaires.

La coloscopie est un examen réalisé à l'aide d'un instrument long et flexible qui permet d'explorer directement l'intérieur du gros intestin. Cet examen sert à déceler de l'inflammation, des polypes ou un cancer du côlon. Les polypes sont de petites excroissances généralement bénignes qui peuvent présenter un risque de cancérisation. Ce procédé permet, dans la plupart des cas, d'enlever les polypes. On procède à l'ablation des polypes en les entourant à la base d'un fil électrique. La technique est indolore et, une fois l'intervention terminée, on envoie le polype au laboratoire pour analyse.

Au début de l'examen, des injections sédatives sont administrées afin de vous détendre. Pour cette raison, nous vous demandons de prévoir un accompagnateur pour le retour et de ne pas conduire à votre sortie de l'examen. **Veillez à ne pas conduire pendant 6 heures après l'examen.**

La coloscopie est un examen sécuritaire, mais tout examen comporte des risques:

- Dans le cas de la coloscopie, il existe un risque très minime de perforer le côlon. Ce risque théorique se situe aux alentours de 1/1000 à 1/2000 dans la littérature. Le cas échéant, il faut opérer le patient pour refermer la plaie. Dans notre expérience, ce type d'incident est extrêmement rare.
- Le saignement survient toujours après une biopsie ou une polypectomie. Mais il est mineur et dans la très grande majorité des cas s'arrête spontanément.

Une cautérisation est rarement nécessaire. Il est extrêmement rare qu'une transfusion soit requise.

- Des réactions adverses ou allergiques aux médicaments sédatifs peuvent survenir rarement.
- Une irritation locale au site d'injection de la sédation peut également survenir. Celle-ci finit par s'en aller après quelques jours ou plus rarement quelques semaines.

En médecine, aucun examen n'est parfait : il arrive, très rarement, que certains polypes ou même certains cancers ne soient pas détectés. Il arrive également que l'on ne puisse pas atteindre l'extrémité du côlon. Ceci survient peu souvent et, en général, est secondaire à l'étranglement ou à la tortuosité de certains segments. Dans ces situations, il est préférable d'arrêter l'examen.

Certains médicaments doivent être arrêtés avant la coloscopie, sauf en cas d'avis contraire de votre médecin:

- Médicaments contenant de l'aspirine (aspirine, asaphen, rivasa, entrophén): **arrêter 7 jours avant**
- Plavix (clodiprogel): **arrêter 7 jours avant**
- Ticlid (ticlopidine): **arrêter 7 jours avant**
- Coumadin ou Synthron: **arrêter 5 jours avant**
- Fer ou médicaments contenant du fer: **arrêter 10 jours avant**
- Pradax, Pradaxa (Dabigatran) : **arrêter 4 jours avant**
- Efient (Prasugrel) : **arrêter 8 jours avant**
- Brilinta (Ticagrelor) : **arrêter 7 jours avant**

Vous devez toujours et absolument consulter et avoir l'autorisation de votre cardiologue avant d'arrêter Plavix, Efient ou Brilinta.

La préparation est extrêmement importante. Le gros intestin doit être propre et vide afin de garantir la qualité de l'examen. Suivez donc rigoureusement les indications de celle-ci.

Bon examen